

Số: 733/UBND-TH

Tp.Kon Tum, ngày 21 tháng 3 năm 2019

V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

KHẨN

Kính gửi: UBND các xã, phường.

Hiện nay, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu phi diễn biến phức tạp có khả năng xâm nhập vào địa bàn thành phố Kon Tum. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi, UBND thành phố Kon Tum yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các xã, phường:

- Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 652/UBND-TH, ngày 15/3/2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách không chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

- Chịu trách nhiệm về triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn mình quản lý.

- Tăng cường công tác tuyên truyền; Thực hiện sao chép, cấp phát tờ rơi về hướng dẫn cách nhận biết và quy trình phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi tới thôn, tổ dân phố, từng hộ chăn nuôi để người dân nắm bắt và thực hiện theo hướng dẫn (gửi kèm theo *hướng dẫn cách nhận biết và quy trình phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi*).


2. Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố: Đăng tải nội dung Văn bản này và các nội dung khác có liên quan đến công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lên Trang Thông tin điện tử của thành phố và hệ thống loa truyền thanh của thành phố; đồng thời, tăng cường thời lượng phát thanh, tuyên truyền về phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên các phương tiện thông tin đại chúng.


3. Các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố: Tăng cường phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi.

UBND thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- UBND tỉnh (thay B/c);
- TT Thành ủy (thay B/c);
- Sở NN và PTNT (p/h);
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (p/h);
- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể TP (T/h);
- Đảng ủy các xã, phường (để biết);
- Lưu VT TH,



HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬN BIẾT VÀ QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

*(kèm theo Công văn số 33/UBND-TH, ngày 21/3/2019
của UBND thành phố)*

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, có thể gây chết ở lợn với tỷ lệ rất cao. Để giúp cho việc nhận biết lợn mắc bệnh, Cục Thú y cung cấp một số thông tin để nhận biết triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc bệnh DTLCP, cụ thể như sau:

I. Cách nhận biết triệu chứng và bệnh tích của bệnh Dịch tả lợn Châu phi:

1. Triệu chứng lâm sàng:

- **Thể quá cấp tính** là do vi rút có độc lực cao, lợn chết nhanh, không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng hoặc lợn nằm và sốt cao trước khi chết.
- **Thể cấp tính** là do vi rút có độc lực cao gây ra, lợn sốt cao ($40,5-42^{\circ}\text{C}$). Lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm chồng đồng, thích nằm chỗ có bóng râm hoặc gần nước. Lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh tím. Trong 1-2 ngày trước khi con vật chết, có triệu chứng thần kinh, di chuyển không vững, nhịp tim nhanh, thở gấp, khó thở hoặc có bọt lỗ mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón, phân cứng đóng viên có kích thước nhỏ, có chất nhầy và máu. Lợn mang thai có thể sẩy thai ở mọi giai đoạn. Lợn khỏi bệnh hoặc nhiễm vi rút thể mạn tính thường không có triệu chứng, nhưng sẽ là vật chủ mang vi rút DTLCP lâu dài.

- **Thể á cấp tính** gây ra bởi vi rút có độc tính trung bình. Lợn biểu hiện triệu chứng không nghiêm trọng. Lợn sốt nhẹ hoặc sốt lúc tăng lúc giảm, giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, viêm toàn bộ phổi nên khó thở, ho có đờm, phổi có thể bị nhiễm vi khuẩn kế phát, viêm khớp, vận động khó khăn, lợn mang thai sẽ sẩy thai. Lợn có thể khỏi hoặc bị bệnh mạn tính.

- **Thể mạn tính** gây ra bởi vi rút có độc tính trung bình hoặc thấp. Lợn có nhiều triệu chứng khác nhau, chẳng hạn như giảm cân, sốt không ổn định, có triệu chứng hô hấp, hoại tử da, hoặc viêm loét da mạn tính, viêm khớp, viêm cơ tim, viêm phổi dính sườn, viêm các khớp khác nhau trong giai đoạn phát triển. Tỷ lệ chết thấp, lợn khỏi bệnh sau khi nhiễm vi rút gây nên bệnh sẽ trở thành dạng mạn tính.

- **Lợn mắc bệnh DTLCP** có biểu hiện các triệu chứng không khác biệt so với triệu chứng của bệnh Dịch tả lợn cổ điển. Do đó, việc chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng thường khó khăn, khó phân biệt với bệnh khác. Vì vậy, cần lấy mẫu gửi phòng thí nghiệm của cơ quan thú y có thẩm quyền để xét nghiệm phát hiện vi rút DTLCP.

2. Bệnh tích:

- **Thể cấp tính:** Xuất huyết nhiều ở các hạch lympho ở dạ dày, gan và thận. Thận có xuất huyết điểm, lá lách to có nhồi huyết. Da có màu tối và phù nề, da vùng bụng và chân có xuất huyết. Có nhiều nước xung quanh tim và trong xoang ngực hoặc xoang bụng, có các điểm xuất huyết trên thanh quản, bàng quang và bì

mặt các cơ quan bên trong; phù nề trong cấu trúc hạch lâm ba của đại tràng và phần tiếp giáp với túi mật, túi mật sưng.

- **Thể mạn tính:** Có thể gặp sơ cứng phổi hoặc có các ổ hoại tử hạch, hạch phổi sưng, viêm dính màng phổi.

II. Quy trình phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi:

1. Tăng cường sát trùng chuồng trại cả bên trong và bên ngoài chuồng trại, lối đi vào chuồng trại, nơi cân xe, khu vực xung quanh chuồng trại, khu xử lý lợn chết hàng ngày.

2. Chăn nuôi cùng vào cùng ra, xử lý nước thải bằng hầm Biogas, cách ly và rải vôi cách ly chuồng trại chăn nuôi.

3. Cổng xuất và cổng nhập phải có hố sát trùng và máy phun thuốc sát trùng, mỗi đầu chuồng trại phải có khay/hố sát trùng và thay nước hàng ngày.

4. Phương tiện ra vào chuồng trại như xe chở lợn, xe chở cám...cần phải được phun xịt sát trùng thật kỹ trước khi vào chuồng trại.

5. Hạn chế người ra vào chuồng trại khi không cần thiết. Khi vào chuồng trại phải qua sát trùng, tắm xà phòng, có quần áo riêng ở trong chuồng trại và có thời gian cách ly ít nhất 24h mới xuống chuồng trại, xử lý, cách ly toàn bộ vật dụng nhập vào trại: ủng, giày dép, lồng nhốt...

6. Thực hiện 5 không: không giấu dịch; không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra ngoài môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

7. Tăng cường chăm sóc đàn lợn chu đáo, phòng bệnh bằng vắc xin đối với các bệnh như: Dịch tả, tai xanh (PRRS), Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, phó thương hàn, viêm phổi truyền nhiễm, không mang thịt sống vào chuồng trại hay cho lợn ăn...

8. Nhập lợn có nguồn gốc rõ ràng, phải có khu riêng nuôi cách ly lợn mới nhập để theo dõi tình trạng sức khỏe, tuân thủ đúng quy trình nhập heo. Giám sát tình hình sức khỏe toàn đàn heo hàng ngày, để đưa ra giải pháp xử lý kịp thời nếu có nghi ngờ về bệnh này.

9. Có biện pháp diệt côn trùng, chuột trong chuồng trại. Không cho chó, mèo, gà vịt.. vào chuồng trại lợn,...
